

Új lehetőség a nagyüzemi és a hobbikertészek kezében a **Benevia**[®] rovarölő szer

2020-ban debütált az FMC-Agro új hatóanyagú terméke, a **Benevia**[®] rovarölő szer, mely az első éves hazai tapasztalatok alapján kikerülhetetlen tagja lett a kertészeti rovarkártévkök elleni védekezéseknek. Piaci pozícióját jól jelzi, hogy már az első teljes évben sikerült az engedélyezett kultúrák körét kibővíteni, immáron a kelkáposzta- és karalábétermelők is eredményesen használják ezt az unikális terméket. Széles körű használatát segítette, hogy az 1 literes kiszérelés mellett a hobbikertészek és a kis területen gazdálkodók számára elérhető lett az 50 ml-es kiszérelés is, melyre a visszajelzések alapján nagy szükség volt.

A készítmény **hatóanyaga a Cyazypyr**[®], mely a diamid csoport (IRAC: 28) második tagja és az első a csoportból, mely a rágó- (lepke- és bogárlárvák) és szívókártevők (tripszek, levél- és molytetvek) ellen egyaránt hatásos. Az új hatóanyag révén a **Benevia**[®] egy új hatásmechanizmust képvisel az engedélyezett kultúrnövények többségében, használatával a rezisztenciát meg tudjuk előzni, vagy ha már kialakult, meg is tudjuk törni azt.

Legfontosabb tulajdonságai:

- ✓ A kertészeti termesztés során előforduló leggyakoribb kártevők széles skálája ellen védelmet nyújt.
- ✓ Hatását kontakt, illetve felszívódó módon is kifejti, erősen transzlamínaris, a növényben jól szállítódik.
- ✓ A kultúrnövénybe felszívódva sokáig megőrzi biológiai aktivitását, így hosszú hatástartamot biztosít.
- ✓ Hatását az izom-összehúzódság gátlása révén éri el.
- ✓ A célkártévkök táplálkozását a **kezelés után pár perccel leállítja**, ezzel a kártevők által terjesztett vírusok átvitele is ellehetetlenül. A kártevők elpusztulásához fajtól függően 1-2 nap, a dohánytripsz esetében 5-6 nap szükséges.
- ✓ Rövid élelmezés-egészségügyi várakozási idők jellemzik. Burgonyában,

hagymafélékben, gyökérzöldségekben 14 nap, káposztafélékben 7 nap, szamócaban 1 nap.

Burgonyában a Benevia[®] valódi vérfrissítés a burgonyabogár elleni védekezésben. Hatását a tojás, a lárva és az **imágók ellen is kifejti**. Hatékonysága és hatás tartama kiemelkedő, hazai eredmények alapján akár 19 nap.



Hagymafélékben (vöröshagyma, mogyoróhagyma, fokhagyma) a jelenleg engedélyezett készítmények közül a **Benevia**[®] az egyetlen, amely véd a hagymafélék két legjelentősebb rovarkártévkökje (**dohánytripsz, hagymalégy**) ellen, ráadásul felszívódó hatásával magas hatékonyságot és hosszú tartamhatást biztosít.

A **gyökérzöldségek** (sárgarépa, gyökéretrepszelyem, gumós zeller, pasztinák, retek, karórépa) termesztése során a **sárgarépalégy és az egyéb lepkefajok** legkisebb károsítása is eladhatatlanná, piacképtelenné teheti termésünket. A jó minőségű, károsítóktól mentes, piacosabb termés érdekében érdemes alkalmazni a **Benevia**[®] rovarölő készítményt.

A **káposztaféléket** (fejes káposzta, kelkáposzta, karfiol, brokkoli, bimbós kel, karalábé) termeszto gazdálkodókat egyre nagyobb mértékben sújtják a sorozatos hatóanyagkivonások, aminek következtében nem maradt elegendő és hatékony készítmény a rovarkártévkökök ellen. A **Benevia**[®] új hatóanyaga (Cyazypyr[®]) révén egyszerre nyújt hatékony megoldást szinte az összes káposztát károsító kártevő – pl. **tavaszi káposztalégy, közönséges liszteske, fehérlepkék, bagolylep-**

kék, káposztamoly – ellen. A **Benevia**[®] valódi tojásölő hatással is rendelkezik, a **molykártévkök tojás, lárva és báb alakját is elpusztítja**, míg a **liszteske minden fejlődési alakja** (kivéve pupárium) ellen hatékony.

További termékinformációk és felhasználási javaslat az FMC-Agro weboldalán és termékkiadványában érhető el.

A megfelelő hatékonyság érdekében a **Benevia**[®] rovarölő szerrel történő ke-

zelés során a zöldségfélék többségét borító viaszos levélfelület miatt növényi olaj hozzáadása szükséges.

A tenyészidőszak kezdetén történő alkalmazásával a rovarkártévkökök elpusztításán túlmenően ki tudjuk használni a **Benevia**[®] rovarölő szerben található Cyazypyr[®] hatóanyag **termésnövelő, vigornövelő hatását** is, mely tovább emelheti nyereségességünket. Termesztési kísérletek igazolták, hogy a **Benevia**[®] készítményre alapozott termesztéstechnológiák 74%-ában növekedett a hozam, egységesebb, piacosabb termést takaríthattak be.

Bízunk benne, hogy az Ön kertészetének is hasznos együttműködő partnere lehetünk újdonságunkkal, mely tavaly már sokaknál bizonyított. Szakmai kérdéseivel forduljon bizalommal az FMC-Agro területi képviselőihez!

További információk:

www.fmcagro.hu

A növényvédő szereket biztonságosan és felelősséggel használja! Kérjük, mindig kövesse a készítmény címkéjén leírtakat annak alkalmazásakor! Az ® jellel jelölt termékek az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkanévei.