

FMC Összhangban a kukorica igényeivel

Hazánk időjárása – főként csapadék eloszlását figyelembe véve – egyre kiszámíthatatlanabb, ezért a tavaszi vetésű növényeink kelése és gyomosodása is gyakran heterogén. Ezek a tényezők arra ösztönzik a kukoricatermelőket, hogy még nagyobb figyelmet fordítsanak a gyomirtó szer kiválasztására.

Olyan terméket kell keresni, amely biztosítja a kukorica tartós gyommentességét, ezáltal megakadályozza a gyomok víz- és tápanyagpazarlását, ugyanakkor kedvező árának köszönhetően a költségtakarékosságot is segíti. A posztemergens készítmények döntő többségét a magról kelő egyszikű gyomok 1-3 leveles koráig, maximum gyökérváltás állapotáig; a magról kelő kétszikűek 2-4 leveles fejlettségéig alkalmazhatjuk. Ritkán fordul elő, hogy 2-4 leveles disznóparéj-félék, 2-4 leveles fehér libatop, vagy a közönséges kakaslábfű és a muharfélék egyszerre, egyöntetűen jelennek meg a táblán. Ebből következik, hogy a tartamhatással nem rendelkező gyomirtó szerek nem tudják, nem tudhatják a megfelelő gyommentességet minden esetben biztosítani.

Az **FMC-Agro Hungary Kft.** az ismertett probléma tükrében megfelelő megoldást kínál a gyomok elleni küzdelemben a **Diniro® Gold** kukorica gyomirtó csomagjával, amely 5 hektár kezelésére elegendő. A csomag összetevői a 2,4 kg **Diniro®** (nikoszulfuron + proszulfuron + dikamba) és a 10 liter **Successor® T** (petoxamid + terbutilazin) kiegészítve a 2,5 liter **Super-Spray*** hatásfokozóval. A **Diniro®** hatékony a már kikelt gyomok ellen, míg a **Successor® T** hatóanyagai több hetes tartamhatást biztosítva gátolják a gyomok csírázását és újrakelését azáltal, hogy a kijuttatás után lehulló csapadék a hatóanyagokat bemossa a talajba (1. kép).

A kombináció hatékony a kukoricában előforduló legtöbb gyom ellen. A magról kelő gyomok (csattanó maszlag, libatop fajok, disznóparéj fajok, keserűfű, parlagfű, se-



1. kép Öt hatóanyaggal a tökéletes eredményért (Telekgerendás, 2016. június)

lyemmályva, varjómák, napraforgó árvakelés, kakaslábfű, muhar-fajok, köles-fajok stb.) mellett több évelő gyom ellen is kitűnő hatékonysággal rendelkezik (pl. mezei acat, apró szulák, fenyércirok stb.). Meg kell jegyezni, hogy az évelő gyomok, a napraforgó árvakelés és a szerbtövis esetében hatása csak a már kikelt, kihajtott egyedek ellen érvényesül. Abban ez esetben, ha a gyomok már kicsíráztak, de még nem keltek ki, várjunk a permetezéssel, mert így sem a csírázásgátló, sem a levélen keresztüli hatás nem tud érvényesülni.

A **Diniro® Gold**ot a kukorica 3-6 leveles korában, a magról kelő kétszikű gyomok 2-6 leveles, a magról kelő egyszikűek 1-3 leveles állapotában kell kijuttatni. Amennyiben a területen fenyércirok van, annak

10-20 cm-es fejlettségénél végezzük a kezelést. Mezei acat tölevélrózsás állapotban a legérzékenyebb a gyomirtóra. Kedvező hektárköltségének és igen széles gyomirtó spektrumának köszönhetően kitűnő megoldás a kukorica állományban történő gyomirtására. Hosszú tartamhatása miatt nincs gond a terület újra gyomosodásával sem.

Diniro® Gold, egy gyomirtó mindenkinél, aki tudja, hogy váltani kell!

☞ FMC-Agro Hungary Kft.

*A növényvédő szereket biztonságosan és felelősséggel használja! Kérjük, mindig kövesse a készítmény címkéjén leírtakat annak alkalmazásakor! Az ® jellel jelölt termékek az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkanevei, * az Agronauta márkaneve.*