

FMC

PROTECT FOR BETTER GROWTH


Evorelle® Express™ gyomirtó szer

EVORELLE® EXPRESS™ GYOMIRTÓ SZER A GYAKORLATBAN

Az Evorelle® Express™ herbicid új megoldást jelent a napraforgó gyomirtás nehézségeivel szembenálló gazdálkodóknak.

	Evorelle® Express™ gyomirtó szer
Forgalomba hozatali engedély száma	6300/369-1/2019. NÉBIH
Hatóanyag	37,5 % tribenuron-metil + 12,5 % tifenszulfuron-metil
Formuláció	Vízoldható granulátum (SG)
HRAC hatóanyag-csoport	B
Hatásmód	acetolaktát-szintetáz működést gátló herbicidcsoport
Kultúra	kizárólag Express®-toleráns napraforgó
Engedélyezett dózis	60 g/ha
Kezelések száma	1 vagy 2 (osztott kezelés)
Kezelés ideje	A kultúrnövény 2-8 leveles állapota között (BBCH 12-18)
Veszélyességi besorolás	H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki. H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Felületi víztől mért, növényzettel borított biztonsági távolság	20 méter
Munkaegészségügyi várakozási idő	0 nap (száradásig)
Élmezés-egészségügyi várakozási idő	Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Kiszerezés	150 g-os műanyag flakon

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT



Csapadéktól vagy egyéb környezeti körülményektől függően az egyéves gyomok esetében új gyomcsírázási hullámok alakulhatnak ki. Ezen gyomfajok visszaszorítása érdekében szükségessé válhat az osztott Evorelle® Express™ kezelés. A két kezelés között legkevesebb 7 nap teljen el. Ez esetben se lépje túl a 60 g/ha engedélyezett teljes dózist!

Ha egyszikű gyomok is jelen vannak a területen, használjon egyszikű irtót pre- vagy posztemergensen. Amennyiben posztemergens egyszikű irtót használ, az egyszikű irtó és az Evorelle® Express™ alkalmazása között legalább 7 napnak el kell telnie.

A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREKET BIZTONSÁGOSAN ÉS FELELŐSSÉGGEL HASZNÁLJA! KÉRJÜK, MINDIG KÖVESSE A KÉSZÍTMÉNY CÍMKÉJÉN LEÍRTAKAT ANNAK ALKALMAZÁSÁKOR!

Evorelle® Express™

gyomirtó szer

HATÉKONYSÁG

	Gyomfajok	Evorelle® Express™ 60 g/ha
Apró szulák	<i>Convolvulus arvensis</i>	
Borostyánlevelű veronika	<i>Veronica hederifolia</i>	
Csattanó maszlag	<i>Datura stramonium</i>	
Fekete ebszőlő	<i>Solanum nigrum</i>	
Keserűfűfajok	<i>Polygonum spp.</i>	
Kövér porcsin	<i>Portulaca olerace</i>	
Libatopfajok	<i>Chenopodium spp.</i>	
Mályvafajok	<i>Malva spp.</i>	
Mezei acat	<i>Cirsium arvense</i>	
Mezei tarsóka	<i>Thlaspi arvense</i>	
Orvosi füstike	<i>Fumaria officinalis</i>	
Parlagfű	<i>Ambrosia artemisiifolia (elatior)</i>	
Selyemmályva	<i>Abutilon theoprasti</i>	
Szerbtövisfajok	<i>Xanthium spp.</i>	
Szíkűfűfajok	<i>Matricaria spp.</i>	
Szőrös disznóparéj	<i>Amaranthus retroflexus</i>	
Tarka kenderkefű	<i>Galeopsis tetrahit</i>	
Vadkender	<i>Cannabis sativa</i>	


Érzékeny gyomfajok

Mérsékeltén érzékeny gyomfajok

Ellenálló gyomfajok

MAGAS HATÉKONYSÁG

A tribenuron-metil mellett tifenzulfuron-metilt is tartalmazó Evorelle® Express™ gyomirtó szer hatékonyabb és kiegyensúlyozottabb hatást biztosít az alábbi gyomoknál: szőrös disznóparéj, szerbtövisfajok, kövér porcsin, selyemmályva, parlagfű, mezei acat, fekete ebszőlő, keserűfűfajok, vadkender (ez utóbbi hím- és nővirágú egyedekre is).



Szőrös disznóparéj



Fekete ebszőlő



Keserűfűfajok

RUGALMAS GYOMIRTÁS

- Felhasználás akár 8 leveles napraforgóban.
- Osztott kezelés, mely lehetővé teszi a gyomfajtól és -keléstől függő időzítést.
- A posztemergens kezelés hatékony gyomirtást eredményez, kevésbé függ a talaj nedvességtartalmától.
- Folyamatosan bővülő hibridválaszték - kérjük érdeklődjön vetőmag-előállító partnerénél.